NOTAS GENERALES

Por F. C. LEHMANN V.

En los últimos años se ha seguido notando el aumento en la dispersión de especies de habitat abierto a regiones anterioremente boscosas, como ya lo he anotado en anteriores oportunidades.

En esta ocasión anoto nuevos records de distribución de algunas especies en el alto valle del Río Magdalena en la región comprendida entre las poblaciones de Garzón y San Agustín en el Departamento del Huila.

Para facilitar la referencia los nombres utilizados aquí son los mismos empleados por R. M. de Schauensee en The Birds of the Republic of Colombia 1948-1959.

ACCIPITRIDAE

Oroaetus isidori (Des Murs) Aguila Real de Montaña


Es muy importante consignar aquí una interesante observación sobre esta rara águila. Entre el 19 y 14 de mayo durante una visita al "Parque Nacional de la Cueva de los Guácharos", en el extremo sur del Huila, muy cerca de la cima de la Cordillera, Oriental, donde ésta forma un recodo que la lleva de occidente a oriente, en las cabeceras del Río Suaza. A eso de las 8 y 30 de la mañana del día 14 observé un grupo de cinco águilas de montaña, compuesto por tres adultas y posiblemente una de edad intermedia (3 años) y una más joven que volaban en una dirección del sureste al noroeste. Mientras volaban emitían sus agudos gritos y aleteaban con relativa frecuencia.

Esto está comprobando mi suposición expresada antes: Lehmann, Novedades Colombianas Vol. I, Nº 4, 1958, de que estas águilas efectúan migraciones, puesto que desaparecen por temporadas de las regiones frecuentadas por ellas. Esta migración venía cruzando la Cordillera Oriental desde su vertiente amazónica, hacia la vertiente del Magdalena y dirigiéndose a la vertiente oriental de la Cordillera Central.

También observé un par de águilas diferentes, que hasta donde pude observar con el anteojo, se asemejaban mucho a *Leucopternis princeps,* pero esta especie no ha sido hallada aún en la vertiente oriental de los Andes. Presentaban estos dos ejemplares un pecho oscuro y una corta cola negra atravezada por una banda blanca en el centro, características ambas que coinciden con la coloración de *L. princeps,* además su tamaño también me pareció aproximado al de esta especie. Mientras observaba esta pareja de águilas, que indudablemente estaban cazando, pasaron los individuos migratorios de *O. isidori* mensionados arriba. La altitud del lugar es de 2.000 metros sobre el mar.

La figura que ilustra estas notas corresponde a una de las esculturas monolíticas del Parque Arqueológico Nacional de (San Agustín) en el Sur del Huila y muy cerca de las fuentes del Río Magdalena. Mucho se ha publicado sobre el maravilloso y variado conjuto de las esculturas Agustinianas y aún no se ha llegado a establecer completamente

su origen, pues los arqueólogos difieren en sus opiniones al respecto. Algunas de esas maravillosas tallas representan animales diferentes.



Escultura Agustiniana que Representa a *Oroaetus isidori* indudablemente.

Foto Lehmann

La que presentamos aquí ha ido publicada en diferente ocasiones y los arqueólogos han creído descubrir en ella un "Buho" y así se ha descrito en algunas publicaciones. Creo sinembargo, que esta magnífica escultura representa sin lugar a dudas a la imponente águila Real de Montaña *Oroaetus isidori*, puesto que no hay ningún "Buho" que tenga un solo cacho, oreja o copete. Cuando estas aves llevan copetes ú orejitas siempre son dos, mientras que la escultura de San Agustín lleva muy bien tallado un hermoso copete que representa una de las principales características de *Oroaetus*. Además están muy bien representadas las enormes y fuertes patas de esta águila que aprisiona en sus garras una culebra, una de las presas favoritas de la mayoría de las rapaces diurnas.

Para comparación recomiendo ver mi publicación: Nuevas Observaciones sobre *Oroaetus isidori* (Des Murs). Contribuciones al Conocimiento de la Fauna de Colombia

XIV, Novedades Colombianas, Vol. I, Nº 4, 1958.

La región de San Agustín está comprendida dentro del área de dispersión de *Oroaetus*, y es uno de los lugares donde es más frecuente. Los indios pre-colombinos que habitaron esa comarca e hicieron las esculturas se habían dado cuenta de la importancia y belleza de esta águila y la tomaron como emblema. Esta hermosísima águila debía ser el emblema nacional de Colombia en reemplazo del Cóndor, que es un comedor de carroña y que además es empleado por otros países en sus escudos. *Oroaetus* en cambio fue descubierto por primera vez en los alrededores de Bogotá que figura como localidad típica de la especie y es por lo tanto más típicamente colombiana. Parece que para el diseño del escudo de nuestra ciudad Capital sí se hubiera tenido en cuenta la existencia de esta bella águila allí, puesto que está emblasonado con un águila negra que es el color general de esta especie en estado adulto.

Aunque esta águila se encuentra desde Venezuela hasta la Provincia de Jujuy en el noroeste argentino, es sin embargo más frecuente en Colombia, fue descrita de aquí y considero que sería la indicada para coronar nuestro escudo, si se pensara en cambiar el emblema como ya varias veces se ha discutido en la prensa a este respecto.

PHASIANIDAE

Colinus cristatus leucotis (Gould) Codorniz

1 ♂ y 1 ♀ ads. Colectados entre Altamira y Pitalito, Jun. 24, 1961, a una altitud de 1.188 mts. Los testículos del macho midieron 11 x 6 mm., el ovario de la hembra 17 x 17 mm., con un ovum de 11 x 11 mm., y un huevo listo a poner. Estos detalles nos indican que en esta época están en plena actividad de reproducción en aquella parte del Valle del Magdalena. Completamos en esta forma los records anotados para *C. c. leucotis* extendiendo su distribución más al sur.

ICTERIDAE

Hypopyrrhus pyrohypogaster (de Tarragon) Arredajo de Abdomen Rojo

Varios ejemplares jóvenes fueron observados y fotografiados en la población de Palestine (Huila), los cuales habían sido capturados en los nidos en el Parque Nacional de La Cueva de los Guácharos, en el extremo sur del Departamento del Huila a una altitud de 2.000 mts.

Como la observación se hizo en el mes de mayo, y como también fuí informado de la existencia de otros ejemplares aún más jóvenes recién capturados en esos mismos días es esto una buena indicación de la época de reproducción de esta especie en esa zona. También es importante anotar que el nacimiento de estas aves coincide con una de las épocas de mayor precipitación de lluvias en la región.
Mayo 9 a 13.

Leistes militaris militaris (Linneo) Bayetón

1 ♂ imm. capturado en La Plata, Huila con gonadas de 1.5 mm., fue obtenido por el autor el 10 de marzo de 1961, mientras estaba siendo alimentado por el padre, en unos potreros secos al O. de la población de La Plata, alt. 1.100 mts. Fueron vistos otros más.

1 ♂ ad. Colectado en el sitio de Criollo 10 km. al O. de Pitalito, Huila el 24 de Jun., de 1961. Alt. 4.200 mts., con gonadas de 8,5 mm. Dos ejemplares más fueron observados en un pequeño pantano. Este ejemplar y los dos más observados representan hasta el momento el límite sur de distribución de esta especie en el alto Valle del Magdalena.

Sturnella magna meridionalis (Selater) Chirlobirlo

1 ♂ ad. con gonadas de 12 mm. Aunque esta especie ha sido ya señalada en esta región anoto el presente ejemplar por los datos obtenidos por la dimensión de los testículos que indican que en esa época, Jun. 24. 1961, se hallaban en plena reproducción. Es notable cómo esta especie invade las tierras de la montaña tan pronto como son privadas del bosque y convertidas en potreros. 10 km. O. de Pitalito. También fueron observados varios individuos 15 km. al S. O. de San Agustín, Huila.