

NOTAS SOBRE ALGUNAS AVES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, FOPAYAN, COLOMBIA

por

KJELL von SNEIDERN

TINAMIDAE

Crypturellus columbianus (Salvadori) Juan Polo.

Crypturus columbianus, Cat. Bds. Brit. Mus., 27, p. 545, 1895 (Nechí, Antioquia, Col).

Hembra ad. col. K. von Sneidern.
Quimarí, Cérdoba, vertientes orientales, 500 m. Mayo 15, 1949.

Común en los faldeos del Cerro Quimarí, que están cubiertos de selva virgen. Allá encontré varias bandadas de 5 a 8 individuos.

FREGATIDAE

Fregata magnificens rothschildi Mathews Tijereta de mar.

Bds. Austr., 4, p. 250, 1915 (Aruba Island, Dutch West Indies).

Hembra ad. col. K. von Sneidern.
Popayán, Cauca, 1750 m. Oct. 9, 1953.

Este ejemplar de *F. magnificens* fué capturado en una de las calles de la ciudad de Popayán, estaba completamente desnutrido y ya no podía volar de cansancio. Lo más probable es, que quería pasar del Océano Pacífico al Atlántico, pero había escogido la travesía muy al sur y se encontró con las Cordilleras demasiado altas sin posibilidad de poder alimentarse.

ARDEIDAE

Ardea herodias subesp. Garzón.

Hembra jov. col. F. C. Lehmann V.
Popayán, Cauca, 1750 m. Dic. 16, 1936.

También fué capturado un macho ad. en el mismo lugar, en el mes de Oct. de 1947, que pertenece al Colegio de Nuestra Señora del Pilar, Popayán.

Estos dos récords demuestran que la migración de este Garzón se extiende hasta Popayán.

Hydranassa tricolor ruficollis (Gosse) Carza.

Egretta ruficollis, Bds. Jamaica, p. 338, 1847 (Burnt Savanna River, Jamaica).

Macho jov. col. K. von Sneider.
Popayán, Cauca, 1750 m. Mayo 13 1947.

Conocida en el Altiplano de Popayán por solo este ejemplar.

ACCIPITRIDAE

Buteo magnirostris ecuadoriensis (Swann) Gavilán.

Rupornis magnirostris ecuadoriensis, Syn. List Accip., ed. 2, p. 91, 1922.
(Vaqueri = ? Vaqueria, northwestern Ecuador).


Macho jov. col. K. von Sneider.
Popayán, Cauca, 1750 m. Nov. 11, 1946.

Híbrido.

Para poder establecer una comparación en cuanto a medidas y coloración del presente ejemplar, que demuestra los caracteres de ser un HÍBRIDO entre *Buteo magnirostris ecuadoriensis* y *Buteo platypterus platypterus*, se han examinado 5 ejemplares de cada uno de los mencionados *Buteos* como sigue:

Las medidas son tomadas en m/m	Buteo platypterus platypterus						Buteo magnirostris ecuadoriensis						Hun- do M jov
	M jov.	M jov.	M jov.	M jov.	M ad.	Prome- dio	M ad.	M jov.	M ad.	M ad.	M ad.	Prome- dio	
Ala	274	280	269	271	274	273,0	222	207	215	217	223	216,8	215
Cola	170	169	163	169	167	167,3	160	152	150	151	156	153,8	163
Culmen (Medida tomada de la cera)	19	17	15	18	17	17,2	17	16	17	16	16,5	16,5	18
Tarso	63	63	59	62	61	61,6	57	50	55	63	57	57	60
Dedo central c/uña	49	43	59	40	43	42,8	38	34	33	37	37	35,8	39
Longitud (Medidas tomadas en ejempl. fresco de la punta del pico hasta la raíz de la cola)	250	250	224	235	232	238,2		200	210	229	210	212,2	200
Iris	10	11,5		12		11,16		9,5	9	10		9,5	10

La descripción del ejemplar HÍBRIDO es la siguiente: Cabeza gris-ceniza. Garganta gris-pálida. Las plumas en el pecho grises, lateralmente teñidas de parduzco, dando al pecho un color leonado. Abdomen blanco-amarillento con escasas manchas de color pardo. Muslo color crema. Subcaudales blancas. Manto, escapulares y coberteras alares medianas y grandes gris-oscuro, con las plumas ligeramente bordeadas con pardo; las plumas de las coberteras menores gris-oscuro, anchamente bordeadas con pardo; las primarias en la base blancas, en el centro bermejas y en la punta negras, con 3 a 4 bandas negras travesales, suavemente marcadas en la parte bermeja; secundarias gris-negruzcas, con una mancha blanquecina extendiéndose desde la base hasta la mitad de la pluma en la parte interior; la parte central teñida con bermejo y atravesada de 3 a 4 bandas anchas, negras. Subcaudales de color crema, algunas con una mancha negra. Cola gris-oscuro, manchada con rojizo en las rectrices laterales y atravesada por 3 bandas anchas, negras.



Híbrido entre *Buteo magnirostris ecuadoriensis* y *Buteo platypterus platypterus*.
Ejemplar disecado.

Leucopternis albicollis williaminae de Schauensee. Gavilán blanco.

Not. Naturae, no. 221, p. 3, fig. 1 (p. 5), 1950 (Quinari, southwestern Bolívar, Colombia).

Hembra med. col. K. von Sneider. Murrucucú, Córdoba, 1500 m. Mayo 31, 1949.

Leucopternis melanops (Latham) Gavilán.

Falco melanops, Ind. Orn., 1, p. 37, 1790 (Cayenne).

Hembra ad. col. K. von Sneider. Umbria, Putumayo, 400 m. Dic. 10, 1947.

Un ave muy rara, conocida anteriormente en Colombia por un solo ejemplar, capturado en Morelia, Caquetá.

Leucopternis princeps zimmeri Friedmann Gavilán.
Auk, 1935, no. 1, p. 33 (San José de Sumaco, Ecuador).

Hembra ad. col. K. von Sneider. Ricaurte, Nariño, 1000 m. Enero 8, 1947.

Un ave rara que es conocida en Colombia por unos pocos ejemplares.

Circus brasiliensis (Gmelin) Gavilán pantanero.

Falco brasiliensis, Syst. Nat., 1, (1), p. 262, 1788 (Pernambuco, Brazil).

Hembra ad. col. K. von Sneider. Santander de Quilichao, Cauca, 1100 m. Agosto 18, 1947.

Este ejemplar concuerda en color con los dos ejemplares de Río Frío, citados por Chapman en Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 36, p. 240, 1917, con la diferencia que la débil huella de "rusty", rojizo que él menciona en el abdomen, muslos y subcaudales, aparece en este solo en la última parte. En lo demás el color del ejemplar de Santander es igual a la descripción de los de Río Frío, hasta en la única pluma subcaudal con manchas blancas.

Otro ejemplar, también hembra, perteneciente al ¹ Mus. Hist. Nat. de la U. del Cauca, fue capturado en el mismo lugar del anterior, el 29 de Dic. de 1946. Este es diferente en color y más grande en todas sus medidas y da una apariencia más robusta y tiene el pico y las patas mucho más gruesas. El tarso del ejemplar negro tiene apenas las 2/3 partes del grueso de él de la fase clara y el pico,

¹ El Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca se escribe en adelante; Mus. Hist. Nat. de la U. del Cauca.

como he nombrado, es más débil en el primero y además tiene la punta más recta y más corta.

El color y el tamaño del ejemplar de fase clara concuerda con la clave de la hembra (imm.) de Mr. de Schauensee en *Caldasia*, 5, no. 23, p. 388, Dic. 1949 y con los dos ejemplares de Buenos Aires citados por Mr. Chapman en *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 36, p. 240, 1917. Tiene el manto, escapulares, coberteras alares y pecho de colores castaño-negruzco y abundantes manchas blancas en esta última parte. La región anal, muslo y subcaudales son rojizas, las plumas en las dos primeras partes ligeramente bordeadas en la extremidad con blanco y la última región anchamente bandada con blanco y con algunas manchas indecisas negras.

Las medidas de los dos ejemplares de Santander son las siguientes:

	Ala	cola	tarso	dedo centr. (con uña)	uña centr.	culmen (sin cera)
Fase negra	402	234	79	50	18	19,5
Fase clara	435	254	83	53	22	22

En averiguación que hizo Mr. M. A. Carriker Jr. a Mr. Herbert Friedmann, "Curator of Birds at the U. S. Nat. Mus.", sobre el *Circus brasiliensis*, de fase negra, descrita aquí, lo informa Mr. Friedmann en carta de Nov. 12 de 1953 lo siguiente:

"I may say that we have several specimens in the collection here that agree with Chapman's description of *Circus buffoni*. We have no birds in the dark phase that lack a rusty tinge on the posterior underparts, but we have three with considerable amount of soiled white around the eye and front of the face. These come from areas as distinct as Argentina, Paraguay and Venezuela. I would doubt therefore that the bird in the Museum of Popayán is anything other than an aberrant plumage".

Es notable que los tres ejemplares Colombianos de fase negra son mucho más pequeños que los dos ejemplares de Buenos Aires, citados por Chapman y la hembra de fase clara de Santander. Como dice Mr. Chapman; más material es necesario poder describir una subespecie.

PANDIONIDAE

Pandion haliaetus carolinensis (Gmelin) Aguila pescadora.

Falco carolinensis, Syst. Nat., 1, pt. 1, p. 263, 1788 (Carolina).

Macho ad. col. K. von Sneider.
Laguna San Rafael, Cauca, 3400 m. Febr. 1953.

Por primera vez se registra esta águila migratoria en las regiones de la Cordillera Central del Departamento del Cauca. Seguramente ha venido, atraída por la existencia de trucha *Salmo gairdneri* en la Laguna San Rafael, que fué sembrada hace seis años.

FALCONIDAE

Micrastur semitorquatus naso (Lesson) Gavilán negro.

Carnifex naso, Écho du Monde Savant, (6), 2, col. 1085, 1842 (Realejo, Nicaragua).

Hembra ? ad. col. K. von Sneider.
Munchique, Cauca, vertiente oriental, 2000 m. Mayo 1949.

El color de este ejemplar es diferente a las descripciones que he visto, por tener toda la parte superior e inferior, cabeza y muslos negros. Las únicas partes donde tiene color diferente son: la cola, que está artavesada por cuatro bandas blancas, interrumpidas a los lados del cañón, y la parte interior de las primarias, que son ligeramente bañadas con manchas blancas.

Las medidas son las siguientes:

Ala	cola	pico sin cera	tarso	dedo central sin uña
277	275	24	86	50

Me informa Mr. Carriker que él mató una hembra de *Micrastur semitorquatus* naso en el mes de Mayo de 1952 en La Candela, Huila, 2270 m. Con este récord se sabe que esta especie se extiende al este de la Cordillera Central.

Micrastur plumbeus Selater Gavilán.

Bull. Brit. Orn. cl., 38, p. 44, 1918 (Carondelet, Esmeraldas, Ecuador). Ibis, 1918, pl. 8.

Macho ad. y hembra jov. col. K. von Sneider.
Dos ejemplares de La Guayacana, Nariño, 250 m. Abril 1944.

Estos dos ejemplares fueron descritos por Sr. F. C. Lehmann en Caldasia, 3, no. 12, p. 225, Oct. 20, 1944.

Falco deiroleucus Temminck Halcón de pecho amarillo.

Pl. col., livr. 59, pl. 348, 1825 (Ilha de Sao Francisco, Santa Catharina, Brazil).

Macho ad. y hembra jov. col. K. von Sneider.
El macho de Munchique, Cauca, vert. oriental, 2000 m. Febr. 1949.
la hembra de Munchique, Cauca, vert. occidental, 1000 m. Dic. 1951.

Estos dos hallazgos demuestran la existencia de este hermoso halcón en ambas vertientes de la Cordillera Occidental.

A R A M I D A E

Aramus guarauna guarauna (Linnaeus).
Scolopax guarauna, Syst. Nat. ed. 12, 1, p. 242, 1766 (Cayenne).

Hembra jov. col. K. von Sneidern.
 Popayán, Cauca, 1750 m. Enero 26, 1947.

Como este es el único ejemplar de esta especie conocido en el Altiplano de Popayán, se puede considerar como extraviado.

C H A R A D R I I D A E

Charadrius haiticula semipalmatus Bonaparte Pellar.
 Journ. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 5, p. 98, 1825 (New Jersey).

Macho. col. K. von Sneidern.
 Popayán, Cauca, 1750 m. Nov. 8, 1950.

Es un ave poco vista en el Altiplano de Popayán, pero parece que su migración se extiende hasta allá.

S C O L O P A C I D A E

Numenius phaeopus hudsonicus Latham Chorlo de pico curvo.
 Ind. Orn., 2, p. 712, 1719 (Hudson Bay)

Macho jov. col. R. E. Irigorri P.
 Popayán, Cauca, 1750 m. Agosto 4, 1944.

Por primera vez se registra este chorlo en el Altiplano de Popayán.

L A R I D A E

Larus atricilla Linnaeus Gaviota.
 Syst. Nat., ed. 10, 1, p. 136, 1758 (Bahama Islands).

Macho. col. K. von Sneidern.
 Popayán, Cauca, 1750 m. Oct. 19, 1953.

Un bello ejemplar, probablemente extraviado de la Costa del Caribe y que ha subido por el Río Cauca, fué capturado en los alrededores de Popayán.

C U C U L I D A E

Neomorphus radiolosus Sclater and Salvin Cucú caza lagartos.
 Proc. Zool. Soc. London, 1878, p. 439, pl. 27 (Intac, western Ecuador).

2 hembras. col. K. von Sneidern.
 La Costa, Cauca, 1000 m. Enero 15, 1937.
 Muchique, Cauca, vertiente occidental, 1000 m. Sept. 15, 1951.

La localidad "La Costa" queda unos 10 km. al norte del Cerro Munchique. En estas regiones se encuentra *Neomorphus radiolosus* con alguna frecuencia, pues en total he coleccionado cuatro ejemplares allá.

STRIGIDAE

Macho. col. F. C. Lehmann V.
Peñablanca, Popaván, Cauca, 2800 m. Agosto, 1938.

<i>Asio flammeus bogotensis</i>	Chapmann	Buho de orejas cortas.
---------------------------------	----------	------------------------

Macho y hembra. col. R. E. Iragorri P.
Popayán, Cauca, 1750 m. Nov. 8, 1943.

<i>Aegolius harrisi harrisi</i>	(Cassin)	Lechucita.
---------------------------------	----------	------------

Hembra. col. K. von Sneidera.
El Tambo, Cauca, 1700 m. Agosto 1950.

En el mes de Dic. de 1939 despaché un ejemplar de la misma especie, cogido en el mismo lugar, para Chicago Nat. Hist. Mus., que fué identificado como *Grisella harrisi*.

BUCCONIDAE

Netharchus macrorhynchus hyperhynchus (Sclater) Pájaro bobo.

Bucco hyperhynchus, Proc. Zool. Soc. London, 1855, p. 193, pl. 105 (Río Napo, Ecuador).

Macho? col. K. von Sneidern.
El Tambo, Cauca, 1700 m. Julio 22, 1948.

Este ejemplar, coleccionado en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, en terreno cultivado donde los bosques son muy escasos, concuerda en color y en las medidas con un macho adulto de Tierra Alta, Córdoba, perteneciente a este museo.

CORVIDAE

Cyanolyca pulchra pulchra (Lawrence) Polla de monte.

Cyanocitta pulchra, Ann. Lyc. Nat. His. New York, 11, p. 163, 1878 ("Quito", Ecuador).

Macho. col. K. von Sneidern.
Ricaurte, Nariño, 1170 m. Enero 9, 1947.

Esta rara ave se encuentra en los bosques tupidos en la vertiente del Pacífico de la Cordillera Occidental.

TURDIDAE

Entomodestes coracinus (Berlepsch) Chiguaco de cachete blanco.

Myiadestes coracinus, Orn. Monatsb., 5, p. 175, 1897 (San Pablo, below Tú-túquerres, Nariño, Colombia).

Macho. col. K. von Sneidern.
Santa Cecilia, Caldas, 700 m. Dic. 3, 1945.

De esta rara especie posee el Mus. Hist. Nat. U. del Cauca un bello ejemplar.

VIREONIDAE

Smaragdolanus leucotis mikettae (Hartert).

Vireolanus mikettae, Bull. Brit. Orn. Cl., 11, p. 38, 1900 (Paramba, north-western Ecuador).

Hembra y macho. col. K. von Sneidern.
El macho es de La Selva, Caldas, 2100 m. Febr. 9, 1946,
y la hembra de La Guayacana, Nariño, 250 m. Sept. 15, 1948.

El ejemplar de la Guayacana comprueba la tesis de mr. de Shauensee en Caldasia, 5, no. 25, p. 938, 1851, que *mikettae* debe existir en Nariño.

El macho de La Selva tiene el color amarillo de la garganta y antepecho más extendido y el color verde-oliva de la espalda y escapulares es más oscuro que en la hembra de Nariño, en lo demás son iguales.

COEREBIIDAE

Dacnis berlepschi Hartert Chupaflor de pecho rojo.

Bull. Brit. Orn. Cl., 11, p. 37, 1900 (Lita, northwestern Ecuador).

Macho. col. K. von Sneidern.
La Guayacana, Nariño 250 m. Mayo 1948.

Hasta ahora son conocidos solo tres ejemplares Colombianos de esta rara especie ,todos coleccionados en La Guayacana.

ICTERIDAE

Gymnostinops cassini Richmond Oropéndula de cara rosada.

Auk, 15, p. 327, 1898 (Camp Albert, Río Truandó, Chocó, Colombia)
Hembra. col. K. von Sneidern.
Río Dubasa, Chocó, 100 m. Sept. 2, 1945.

Este ejemplar y nueve más estaban en unos árboles altos en la orilla del Río Dubasa, un afluente en el margen derecho del Río Baudó, Chocó, cuya desembocadura se encuentra unos 60 km. de Pizarro, Río Baudó aguas arriba.

Es posible que *G. cassini* es abundante en estos ríos y no se ha coleccionado más que este y otro ejemplar que maté más arriba en el Río Baudó, porque es difícil distinguirlo de otras Oropéndulas en los árboles altos o en el vuelo.
